

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagian berikut :

1. Respon terbaik varietas tanaman hias bunga pikok terhadap POC rebung bambu aur ditunjukkan oleh varietas *Symphyotrichum ericoides L.* atau bunga pikok putih terhadap variabel pengamatan tinggi tanaman 2 mst, 4 mst, 6 mst, diameter batang 4 mst, 6 mst, dan jumlah kuntum bunga.
2. Pemberian POC rebung bambu aur dengan konsentrasi yang berbeda direspon berbeda oleh masing-masing varietas tanaman hias bunga pikok. Konsentrasi 400ml/liter larutan (R2) direspon terbaik pada variabel pengamatan umur berbunga dan diameter bunga.
3. Interaksi antar tiga varietas tanaman hias bunga pikok dan POC rebung bambu aur direspon nyata pada parameter jumlah cabang dan lama kesegaran bunga.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka untuk mendapatkan pertumbuhan dan produksi tanaman hias bunga pikok yang baik maka disarankan untuk menggunakan konsentrasi POC rebung bambu aur 400 ml/liter larutan. Juga melakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan POC rebung bambu aur tetapi dengan dosis yang lebih tinggi serta interval pemberian POC rebung bambu aur lebih dirapatkan (interval 1 minggu).